

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Anexo 1. Escala internacional abreviada de severidad de la retinopatía diabética

Nivel de Severidad	Hallazgos en la oftalmoscopia bajo midriasis
No RD	No anomalías
RDNP leve	Microaneurismas
RDNP moderada	Microaneurismas asociado a menos de 20 hemorragias intraretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes, exudados duros, manchas algodonosas, arrosamiento venoso en sólo 1 cuadrante
RDNP severa	Microaneurismas junto a uno de los siguientes hallazgos: a) Hemorragias intraretinianas severas (>20) en cada uno de los 4 cuadrantes, b) Arrosamiento venoso en ≥ 2 cuadrantes, c) Anomalías microvasculares intrarretinianas (AMIR) en ≥ 1 cuadrante
RDP	Neovasos y/o hemorragia preretiniana o hemovítreo

RD: Retinopatía diabética, RDNP: Retinopatía diabética no proliferativa, RDP: Retinopatía diabética proliferativa

Fuente: López Gálvez MI. Escala internacional de severidad de la retinopatía y del edema macular diabético. Arch Soc Esp Oftalmol. 2004;79(4):149-50. doi: 10.1016/j.jcte.2017.07.004.