

GALERÍA FOTOGRÁFICA

CISTICERCOSIS PORCINA EN EL PERÚ

Elizabeth Sánchez Romaní¹

¹ Laboratorio de Zoonosis, División de Parasitología, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. Lima – Perú.

El complejo teniasis-cisticercosis constituye un importante problema de salud pública, que prevalece en lugares donde existen malas condiciones sanitarias e higiénicas. Se presenta en algunos países de Asia, África, América Latina, entre otros, con frecuencias altas en México, Brasil y Perú.

El cerdo al ingerir heces humanas con huevos viables del parásito adulto de *Taenia solium* proporciona condiciones ideales para que el embrión hexacanto u oncosfera se desarrolle en sus tejidos hasta la forma larvaria **Cisticerco**, la infección se conoce como cisticercosis. El hombre al alimentarse con carne de cerdo conteniendo cisticercos viables desarrollará en el intestino delgado el parásito adulto de *Taenia solium*, produciéndose la teniasis.

Las fotografías que mostramos a continuación, corresponden a un caso de cisticercosis porcina diagnosticada en el Laboratorio de Referencia Regional de Ayacucho (2002).



Foto N° 1. Cisticerco de *Taenia solium* en tejido muscular de cerdo infectado naturalmente.



Foto N° 2. La flecha indica el escolex invaginado.



Foto N° 3. Múltiples cisticercos aislados de tejido muscular de cerdo infectado naturalmente.